

Topical Paste

Paste for the local anaesthesia of the oral mucous tissues

Composition

Benzocaine 20%, Benzalkonium Chloride 0.1%, food flavouring, excipient ad 100%

Properties

Thanks to its composition, Topical paste possesses two distinct activities:

- ▶ Local anaesthesia due to the Benzocaine, active ingredient pertaining to the group of aminoesters
- ▶ Antiseptis due to Benzalkonium Chloride, pertaining to the family of quaternary ammonium with bactericidal activity

Topical paste acts within a minute after application. Its action lasts about 15 minutes, depending on the applied quantity.

Topical paste is available in six different flavours strawberry, banana, mint, cherry, bubble-gum, pineapple, and can be used for children over the age of 5 as well as for adults, according to their preferences.

Indications

- ▶ Local anaesthesia of the gums before injection
- ▶ Superficial analgesia of the gums before extraction of deciduous teeth
- ▶ Local anaesthesia of the oral mucous tissues before deep scaling or other treatment (lancing of abscess...)

Direction for use

- ▶ Dry the place prior to application
- ▶ Apply a small quantity of gel using a cotton pellet or an appropriate instrument
- ▶ Ask the patient to rinse the mouth to eliminate a possible excess from the product
- ▶ Wait one minute prior to the treatment

Warning

Risk of hypersensitivity to Benzocaine or of sensitization to one of the constituents (the patient should be inquired of a possible sensitivity to one of the components). The product should be used with precaution on injured or irritated oral tissues, as well as on children. Do not use for children under the age of 5. Avoid any overdose.

Daily maximum applicable amount locally 300mg of Benzocaine, corresponding to 1.5 g of Topical paste. Swallowing of a very small quantity is not harmful. In case of ingestion of a large quantity, consult with a physician.

In case of contact with the eye rinse cautiously with soft, clean water for 15 minutes, holding the eyelids open, and call a doctor immediately.

Storage

Store at room temperature between 15°C and 25°C, protected from direct light and humidity.

Shelf life

3 years.

Packaging

Jar of 30 ml, 6 Flavours	REF
Strawberry	11252
Banana	11253
Mint	11254
Cherry	11255
Bubble-gum	11256
Pineapple	11257

For dental professional use. Made in Switzerland.

MODE D'EMPLOI

Topical Paste

Pâte topique pour l'anesthésie des muqueuse buccales

Composition

Benzocaine 20%, chlorure de benzalkonium 0.1%, arôme alimentaire, excipient ad 100%

Propriétés

Grâce à sa composition, Topical paste possède deux activités distinctes

- ▶ Anesthésique local de surface grâce à la benzocaïne, principe actif appartenant au groupe des aminoesters
- ▶ Antiseptique grâce au chlorure de benzalkonium, appartenant à la famille des ammoniums quaternaires à activité bactéricide.

Topical paste est déjà active une minute après l'application. La durée d'action est fonction de la quantité administrée (généralement 15 minutes).

Topical paste est disponible en six parfums différents banane, bubble gum, menthe, fraise, cerise et ananas, et peut être administrée aux enfants de plus de 5 ans comme aux adultes, selon leur goût.

Indications

- ▶ Anesthésie locale de la gencive avant injection,
- ▶ Analgésie superficielle des gencives avant extraction de dents temporaires
- ▶ Anesthésie locale de la muqueuse buccale avant détartrage ou autre soin (abcès à percer...)

Mode d'emploi

- ▶ Sécher préalablement la muqueuse
- ▶ Appliquer une petite quantité de gel à l'aide d'une boulette de coton ou d'un instrument idoine
- ▶ Demander au patient de se rincer la bouche pour éliminer un éventuel excès de produit
- ▶ Attendre une minute avant d'effectuer le traitement.

Mise en garde

Risque d'hypersensibilité à la benzocaïne ou de sensibilisation à l'un des composants (une anamnèse du patient est recommandée pour déceler une éventuelle sensibilisation à l'un des composants).

Le produit est à utiliser avec précaution sur les muqueuses lésées ou irritées, ainsi que chez l'enfant. Ne pas administrer aux enfants de moins de 5 ans. Eviter tout surdosage.

Dose maximale quotidienne applicable localement: 300mg de benzocaïne, correspondant à 1.5 g de Topical paste. L'ingestion de très petites quantités n'est pas dangereuse. En cas d'une grande quantité, consulter un médecin.

En cas de contact avec l'œil rincer précautionneusement avec de l'eau douce et propre pendant 15 minutes en tenant la paupière ouverte, et appeler un médecin immédiatement.

Stockage

Conserver à température ambiante entre 5°C et 30°C, à l'abri de la lumière directe et de l'humidité.

Durée de conservation

3 ans.

Présentation

Pot de 30 ml, 6 arômes:	REF
Fraise	11252
Banane	11253
Menthe	11254
Cerise	11255
Bubble-gum	11256
Ananas	11257

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en Suisse

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Topical Paste

Паста для аппликационной анестезии слизистой оболочки полости рта.

Состав

Бензокаин 20%, бензалкония хлорид 0,1%, пищевые ароматизаторы, вспомогательные вещества до 100%.

Описание

Благодаря своему составу, препарат оказывает 2 различных действия: местноанестезирующее (бензокаин — анестетик из группы аминоэфиров) и антисептическое (бензалкония хлорид — бактерицидный препарат из семейства четвертичных аммониевых солей). Воздействие Topical paste начинается в течение 1 минуты после нанесения и сохраняется около 15 минут, в зависимости от количества нанесенного препарата. **На рынке представлено 6 разновидностей препарата с различными вкусами** клубника, банан, мята, вишня, жевательная резинка и ананас. Рекомендован к применению у взрослых и детей от 5 лет в соответствии с предпочтениями каждого пациента.

Показания к применению

- ▶ Аппликационная анестезия перед инъекционным обезболиванием
- ▶ Поверхностная анестезия десен перед удалением временных зубов
- ▶ Аппликационная анестезия в пародонтологии — перед проведением скейлинга, вскрытием абсцесса и т.д

Способ применения

- ▶ Просушить место аппликации
- ▶ Нанести небольшое количество препарата на слизистую оболочку с помощью ватного шарика или подходящего инструмента
- ▶ Попросить пациента прополоскать рот, чтобы удалить излишек препарата
- ▶ Подождать 1 минуту для наступления эффекта

Меры предосторожности

Не применять препарат у пациентов, страдающих аллергией на этиламинобензоат (бензокаин) или другие компоненты препарата.

Перед использованием обязательно уточнять у пациента, не было ли у него аллергических реакций на эти вещества.

Topical paste следует применять с осторожностью на раздраженной или поврежденной слизистой оболочке и у детей. Не рекомендован к применению у детей младше 5 лет.

Избегайте передозировки. **Максимальная суточная доза бензокаина при местном нанесении** — 300мг, что соответствует 1,5 г Topical paste. Проглатывание небольшого количества препарата безвредно. При проглатывании значительного количества препарата обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5°C-30°C в сухом, защищенном от прямого света месте.

Срок хранения 3 года.

Упаковка

флакон 30 мл, 6 вкусов:

клубника	11252
банан	11253
мята	11254
вишня	11255
жевательная резинка	11256
ананас	11257



только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey . Switzerland

www.pdsa.ch
© PD 140210